産科内術手術口訣

全

産科内術手術口訣

蘭臺賀川先生口授
伏見賀川先生校正
門人 北越 佐 友明
雲陽 原 協 筆記

坐草

子宮冐ト云アル是子宮ノ口ヲ轉サル中ニ子頭ニテツキ出ス故ニ先指ニテ候フニ橫骨ノ方ヘハ少モ指入ラヌ故ニ會陰ノ両辺ヨリ探リ上ノ方ヘ撫テ見ルト自然ニ指陰門ノ上辺ヘ出ルモノハ子宮冐リニ暫ク差置ト子宮ヲ轉メ娩スルモノニ是一ツノ心得也故ニ爰ニ出ス

術曰先臨産ノ腰痛ト決シタラハ直ニ婦ノ脊ニ回リ医ノ右ノ手ニ襁褓ヲ懸テ肛門ヲ押ヘ持チ陳疼ノ来ル時中指ヲ抗テ會門ノ上ヨリ按テ入レ候ニ子宮脊後ニ向ヒ知レ難キ時ハ前ヨリ脊ヘ向テ入テ候ハ能リ知ルモノ也痛モ酸ク強クナルニ分免ノ期ト知ルヘシ是ヲ候フ時ハ臥床ニフトン或ハ火熨臺杯ノ如キモノニ倚ラセ置テ候フ也

臨産ノ時子頭ウツムキ屈メ會陰ヘツヽハル時腕ニテ受テ前ニシゴキ押ハツシ児頭ヲ両手ニ

テ変テ揺リ會陰ニヒキツケ向フウヘ突キ婦ノ
前ノ方ヘ手早ク押ヘシ
子頭生テリレヨリ下出難キハ産ヌトクト居ラ
セ婦ノ前ヘ廻リ傍人ニ後ヨリ把セ置キ會陰ニ押
付サシ見ルト児ノ手當ル指股ヲテ出ス可シ
又臍ニナリ肩抔懸リカヽマリテ出兼ル時ハ能
々能々氣ヲ付骨ユカミヲヒ子リ返シ橈骨ニ付
テ引出ス可シ已ニ免セハ直ニ陰門ヲシカト押
ヘ覆ヘシモ可シ一度ニ惡露下ラサル様ニ氣ヲ
付可シ是ハ分免ノ時直押シ暫ク勢ヲサクレハ

後ハナシテモ苦シカラヌ也

拵倒

術曰先婦ヲ仰臥セシメ児ノ左右足ヲ竅ニ向ハ
ヘシ逆産ノ児ハ多ハ左足ヲ先ヘ出ス者也若左
足出レハ法ノ如ク床ヲ移ヲ令医産婦ノ前ニ回
テ医左右ノ食中指四指ヲ以テ挟ヲ膣中ノ左ノ
傍ニ推入レ左ノ両指ニ推畱メ右ノ両指ニテ左
足ヲ探リ出シ初推込タル右足後出シ左右齊ク
引出スヘシ腟迫出タル時右手ノ三指ヲ隔テ同
リ挟テ引出シ已ニ膝マテ出タレハ柔ナル襁褓

ニテ巻キ両手ニテ上下ヨリ掛ケシッカト持テ引
ヘシ己ニ股ニ及時久シ樵ニヒテリ膝骨ヲハツ
シ出ス可シ膝骨ハツレ丸キハ腰節迄出ツ是時
両手ニテ胸骨ヲ撼リ持引出ス右ノ掌ヲ卸テヒ
ナシ肋骨ノ両方ヲ撼リ樵手三歩ニカケ左右ニ
ヒテリ徐々ニ出ス可シ左右共肩ニ手ノ力ヽヽ
程ニナリタラハ中指ニテ下ニソロ々ト押出セ
ハ臂ヨリハ子出ス者ニ是又左右同シ丁ニ若加
仲様ニシテモ手ノ出サル時ハ先ツ上樵骨ノ方
ヘ拘ケ持會陰ヨリ指ヲサシ是又ニ若先ノ手臂

手ニ当ル時ハ鼻隆伴ト一ツニ持引出ス可シ頭ハ尻ノ食中ニ指ヲ顱骨ニ得ト掛テ押ヘ付テ上ノ方ヘ引抜ヘ一本ニ食中ニ指枕骨ニ当タルノ一匀有リ片足ヲ出ス禁テモ又キルハ鼻足ノ左右ノ得ト見分ケ足ヲ縮ニ巻キシカト持チ出メル方ヘ向ケ強ク斜ニ引ク時ハ先足ノ股曲ヲ欠シ探リ得ト知テ中指ヲ以テ肉ニ掛ケ徐々ニ引出スヘシ先ニ出タル足ヲ連テ力息ニ應シ引出スヘシ夫ヨリ后ノ術ハ前ニ同シ始メ出タル足ハ至テ大ニ紫色ニ腫ルヿアリ此ハ当帰尾湯ニテ数々薰洗メ可之

挙孕

一子分娩シテモ腹格別ニ減セサル者ハ孕胎ニテハ無ヤト心ヲ付ヘシ然𪜈腹中水気アルカ或ハ水腫ニテ腹ノ強ハ甚紛レ易キ故ニ水気ト妊脈トノ分別術ヲ以テ見分ツ可シイヨイヨ孕胎ニ決シタラハ術ヲ以テ救フベシ

是術曰孕胎ト云コヲ必婦人ニ聞ス可カス是血暈杯ヲ恐テ之先順生シテ右逆ヲ免サエルニハ胞衣ヨリ下ト云テ婦ヲ御臥セシメ力息ツヨク来ルヲ待テ白膜ヲ爪ニテ破リ分娩セシメテ可シ

膜ヲ冗ニテ破リ出スコトハ孪胎ノ右逆ニ限ルコト
之何故冗ニテ破ルトイハ九順ノ児ハ自然ノ時
ニテ生ルヽモノ故ニ右逆モ生ヲ促メ可シ捨置
テモ多免スルナレモ早ク多免セシカ為メノ術
嘉ハ挘倒ニ同シコトシ　孪胎ハ初生ノ児免セハ
後生亦免胎亦活胎ナレハニ子一時ニ啼サヌ様
ニスヘシ右ニ云如ク胞衣ヲ下スト詐リ挘倒ノ
術ニテ出ス其時児ヽ手足ヲ纏メ襁褓ノ如キモ
ノニ巻キ竊ニフトンノ下ニ置時ハ啼ヌモノ故
ニ婦ノ知様ニ許ル可シ　胞衣ヲ下スニハ血塊

アルガ故下サ子ハ後ニ害ヲ為ス由シケトシ穏密ニ抜去ル可シ扱胞衣ノ緒ハ後生ノ逆ニ生レタ方ノ臍帯ヲ取リ徐々ニ引出ス可シ尤順ノ緒ヲ取揃ヘ引出スヘシ尤順ヨリ下スヘカラス尤順ヨリ下セハ出難シ如何トナレハ尤順ノ帯ハ胞衣ノ中央ニツキ左逆ノ帯ハ胞ノ端ニツキ傾キ易キ者故ニ出易キ也胞衣ヲ下ス更帯ノ座ヨリハ大更ノト心得可シ

整擡ノ

術曰先ツ芏サセテ候フニ子頭モ能ク手ニサワ

リ切論出スタル児ノ手ヲ医而之食中ノ四指ニテ胞中ノ児ノ方ヘ押入レ而後ニ整胎ノ術ヲ施スヘシ然婦ヲ御臥セシメテ行フ又右ノ手ヲ出スモ希ニアルヘシ児頷下ヨリ出ス故ニ指先ヲ少シ出ルナリ先テ探リテ子頭ノ應スルモノハ肘近出タリ氏術ヲ行フ可シ假令月門ヘ手ヲ出サス氏子頭ノ手ニ應セサルハ此術ノ主ル所ニ非ス

坐産

術曰婦ヲ御臥セシメ力息ヲ待チ児ノ膝曲エ医ノ中指ヲカケ左右斉リ互ニヒ子リ力息ニツレ

テ左右ト上ノ方エ互ニ鉤ニ引出スヿ可シ指頭甚
タ掛リ難キ者ハ大抵ハ膠ノ辺近出タル時両手
ニテ子ノ両方ヲ揃出スヿ丈ヨリ左右ノ脛ヲ円
ニ向ケテ押セハ足先ヨリ出ルヿ亦股面ニ向テ
居ル者アリ互寄中ノ寄ニメ千万中ノ一二ノミ
此時ハ婦ノ左ヲ敷キ褥ニ臥サシメ医婦ノ後ニ
廻リ右脚ヲ延ヘ鉤ニ踏立膝上ニ婦ノ右足ヲ持
セ挙ケ股ヲ開カセ両ノ股ノ屈メニ中指ヲカケ
會陰ニアテ引出スヘシ大抵出タラハ常ノ通リ
ニメ出スヘシ捕ヘヤウ掛倒ニ同シ頭ニ至テハ

頭ニ手ヲ掛ケ出スヘシ然氏坐産顔面ハ至テ免シ難シ故ニ會陰ニアテヽ引出スヘシ尤顔面ハ坐産ニ限ルト知ル可シ

狂産

術曰先ツ狂婦ノ右ノ手首ヲ取ルニ医ノ右ノ手ニテ寛カニ握リ掌甲ニテ自由ニマハル様ニス併体ヲ屈メ右ノ握リタル手ヲ医ノ肩ニ引掛ケ尤ノ手ヲ婦ノ腹前ヨリ裏手ニメ腰ニマワリ得ト把ヘ拳腰ニテ婦ノ両足ヲ振出シ徐々ニ蓐所ニ至リ医右ノ膝ヲツキ左ノ膝ヲ立テ伴ヘ婦ニ当

ニ置キ引又ニ婦ノ足ヲ医ノ股ト左肘トニテ挾
ミ持テ動カヌ様ニメ偖陰門ニ両手ヲ寄セ生レ
カケシ児頭ヲ挿ヘ引出スヘシ速ニ出ル者ナリ
若又股ヲ付ケテ開カサル時ハ右肘ヲ以婦ノ内
股ヲ外ヘ押セハ痛ニ堪ヘス開クヘシ而後ニ生レ
タル児ヲ見セシムレハ狂自ラ鎮マル者也

壯尾壯胸

是膝骨斜ニナル故ニカヽル也是斜ナルヲ得ト
詳ニメヒネリ直ス時ハ出ル也
術曰婦ヲメ御臥セシメ医婦ノ前ニヨリ両掌ヲ

児ノ両胸ニ当テ持チ柔カナル綿衣ニテ巻キ左右ヘ斜ニ引キ會陰ハ押付ケ互ニ引クトキハ必ス膂骨ヨリ反リ出スヘシ又壮胸ノ法ハ前ニ同シク鳩尾ニ至テ力ヽルナリ医両掌ヲ児ノ腹背ニ当テ是モ亦會陰ニ当テ壮尾ノ法ノ如ク右左ヘ斜ニ引付クトキハ胸肋徐々ニ出ル丈ヨリ押倒シテ出スヘシ又児ノ腋力ヽリタルヲ壮胸ト心得誤ルヿアリ児ハ腋ノ力ヽルヿ尾ト胸ト知為ルモノニ審ニ察テ術ヲ施ス可シ又臍下マテ出テ後生レサルハ壮胸ニ非ス肩ノ力ヽリタルト知ル

ト知ル可シ

鉤胞

術曰先腹ヲ按シ一通リハ臍下迄下リテアレハ探リ見ルト手ニサワル者ハ婦ヲシメ御臥セシメ両手ニテ脇腹ヨリカキ　テ医者ノ手ニテ胞蒂ヲ得ルトキメヲキ右ノ手ニテ段々クリヨセ易レニテモ下ロスハ或ハ左リ或右ノ傍ヨリ押寄セクリ下スヘシ探リ当リシ時胞蒂ニ爪カケ引出ス可シ蒂ハクレタトメスベリ甚ダ取着スル者故爪ヲ深クカクルヲ肝要トス又胞衣ト子宮ト

取遠コトアリ子宮ハ押テワフレ又胞衣ハヤワラカニメ押セハワフレルモノ之是ヲ分ツ甚大切ニ又如何様ニ探リテモ胞衣手ニサワラヌコアリ胞帯ヲ棄置子宮口ニ向テ得ト探リ見ルトキハ白膜ノヘリ指ニサワルニ是ヲ便ニ徐々ニ引出スヘシ　依胞衣一両日モ下ラサルトキハ級ハ女モ便ニハ成ル又ハ力弱産婆ノ如何程引ヘタヤラ知ムサル故イワニテモ級ハ便ニナラスト心得可シ　小産ノ胞衣ハ捨置テモ若シカラス自ラ下ルニ然圧七ヶ月頃ヨリハ捨置キ難シ術

ヲ以テ救フ可シ　又胞衣陰門口近下リアリテ出易キ症ナラハ婦ノ後ヨリ膝ヲ旁人ニ把イサヒ次ニ引上ケ置キ膝ヲ前ヘ反リ出サセ医婦人ノ前ニ向ヒ出メ可シ　且テ胞衣ヲ出ス時ハ婦ヲ仰臥セシメテ術ヲ施ト知ル可シ

歛宮

歛宮術曰先ツ竜乾キ久々ナラハ婦ヲ仰臥セシメ医左ノ側ニ寄リ両手ノ指ニ唾ヲ能ヌリ左右ノ指ニテ徐々ニ撰集メ子宮中ノ肉ニアタラヌ様ニスヘシ次々ニテ[illegible]サワルト大痛ム故ニ尤

左ノ四指ニ唾ヲヌリ摘ミ逆手ニテ右ノ手ニ添テ會陰ニ押込ミ置右ノ食中二指ニテ肛中ヘ二寸程入レ反テ橋骨ノ上ヘ向ケ推上ルヽ又残ラス出タラハ両拇指ニテ交骨ノ間ヲ少シ押込ミ形ヲナシ剤収リタルヒタアル故ニ収リ易シ若剤ハ剤ニ同シ両脇ト入置キ居直ニ股ヲ合セ一時許リモ帯ニテ結ヒ置キ膝ヲ反ラセ互ニカイモノヲ為テ少ク高クシテ足ヲ伸ハサセ御臥サス可シ小便ハ度々左キ襁褓ニテミ当テ押ハ採々ニ浸シトラミム臂医テ大ニ動スヿ勿レ若日

ヲ経テ剛リ久ルハ当帰芎ヲ煮シ和ケ後術ヲ施
ス可シ

遏崩

賀川先生曰以術雖救師門不用遏崩術遏崩方

鯉魚霜

右以所用者鮒霜生鯉魚新焼為用之

産科内術辨畢

安政五歳在戊午未秋初六日記終於我
皇都油小路執中館塾中
伯水軒主人舊域源擬一